Arboviroses : Clinique et prévention

Dr Anke Bourgeois

Webinaire ARS 11/06/2024

Principales arboviroses :

(Arthropod born virus)

Nombreux virus!
(> 100 pathogènes pour l'homme)

Famille	Genre	Arbovirose	Vecteur	Répartition géographique
Flaviviridae	<i>Flavivirus</i>	F. Jaune Dengue Zika E. Japonaise West Nile E à tiques	Moustiques (Aedes) Moustiques (Aedes) Moustiques (Aedes) Moustiques (Culex) Moustiques (Culex) Tiques	Afrique & Am. intertropicale Monde (Z. intertropicale) Monde (Z. intertropicale) Asie SE Am N, Afrique, Europe Europe centrale et du nord
Togaviridae	<i>Alphavirus</i>	Chikunguya O'Nyong Nyong E équines américaines Mayaro	Moustiques (Aedes) Moustiques (Anophèles) Moustiques (Aedes, Culex) Moustiques (Aedes)	Monde (Z. intertropicale) Afrique Amérique Amérique, Caraïbes
Bunyaviridae	<i>Phlebovirus</i>	Toscana virus V du Rift	Phlébotome Phlébotome	Pourtour méditerranée Afrique, MO
	<i>Nairovirus</i> <i>Bunyavirus</i>	Crimée Congo Oropouche	Tiques Moustiques (Culex)	Europe, Afrique, MO, Asie Amérique, Caraïbes
Reoviridae	<i>Orbivirus</i>	F. Du Colorado Orungo	Tique Moustique	Amérique N (Ouest) Afrique
Rhabdoviridae		Chandipura Virus	Phlébotome	Inde

NB : autres arboviroses moins fréquentes

Flavivirus : Usutu, Murray Valley, Kunjin, Kyasunur forest, Rocio, Saint-Louis, Powassan...

Alphavirus : Sindbis, Ross River, Barmah forest, Una...

Bunyavirus : Bwamba, Tataguine, Bunyamwera, Ilesha...

Orbivirus : Changuinola, Kemerevo...

Généralités

3 grands syndromes
Traitement symptomatique

• Clinique :

- Contexte épidémique fréquent, formes asymptomatiques +++
- Incubation courte (1 à 2 semaines, maximum 3 semaines)
- Formes **algo-éruptives** « dengue-like » :
 - *Alphavirus* : Chikungunya, F. jaune, O'Nyong Nyong, Ross River, Sindbis, Mayoro
 - *Flavivirus* : dengue, West Nile
 - *Bunyavirus* : Bwamba, Bunyamwera, Tataguine...
 - *Phlébovirus* : Vallée du Rift
- Formes **méningo-encéphalitiques** :
 - *Alphavirus* : E. équines américaines...
 - *Flavivirus* : E. à tiques, E. japonaise, West Nile...
 - *Phlebovirus* : Toscana V
- Formes **hémorragiques** :
 - *Flavivirus* : dengue, F. jaune, Forêt de Kyasanur, Omsk
 - *Phlébovirus* : F. Vallée Rift...
 - *Nairovirus* : Crimée-Congo

• Diagnostic :

- Leucopénie, thrombopénie, cytolysé hépatique, CRP basse
- PCR, isolement de virus, sérologie (Ig M/G), Antigène NS1 (dengue, zone épidémie)

• Traitement : Symptomatique

- Antalgiques, antipyrétiques, mesures de réanimation...
- Anti inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : si chikungunya (voire corticoïdes), à éviter si dengue

Répartition géographique dengue, chikungunya, zika

Dengue, European Center for Disease control (ECDC), 2024

Complications = hémorragies

Chikungunya, US Center for Disease control (CDC) 2024

Arthralgies : petites articulations

Zika, Organisation mondiale de la santé (OMS) 2022

Complications neurologiques
Microcéphalies : 1% des nouveaux-nés

Les plus fréquentes (DO)

Dengue, Chikungunya
Zika

- **Dengue :**

- La plus fréquente
- 4 sérotypes, pas d'immunité croisée
- Sd grippal brutal ($> 39^{\circ}\text{C}$)
- Forme algo-éruptive (céphalées, myalgies)
- Exanthème
- Complications : **hémorragies** 1%, 30000 décès/an
- Particularité : Ac facilitants (formes + sévères)

- **Chikungunya :**

- Syndrome algo-fébrile brutal
- **Arthralgies** et gonflement **petites articulations** (50%), formes chroniques (10% à 3 ans)
- Rash maculeux (50%), signes digestifs, respiratoires, ORL

- **Zika :**

- Transmission sexuelle (2 à 3 mois)
- Exanthème maculo-papuleux **et/ou** fièvre
- Hyperhémie conjonctivale, arthralgies, myalgies
- Atteintes **neurologiques** :
 - Sd de Guillain-Barré, neuropathies...
 - Microcéphalies (T1++, T2), 1% => troubles irréversibles du développement

Les plus fréquentes : clinique en résumé

Principaux symptômes de la dengue, du chikungunya et du Zika

En l'absence d'autre signe d'appel infectieux

Dengue/Chikungunya

Fièvre > 38,5°C sans point d'appel infectieux

et

≥ 1 signe : céphalées, arthralgies, myalgies, lombalgies douleur rétro-orbitaire

Zika

Exanthème avec ou sans fièvre, sans point d'appel infectieux

et

≥ 2 signes : hyperhémie conjonctivale, arthralgies, myalgies

Diagnostic étiologique

- Rechercher systématiquement les 3 infections dengue, chikungunya et zika
- Contrôle à distance (10-15j) si IgM isolés

Diagnostics différentiels : palud, rougeole, primo infection VIH, rickettsiose, leptospirose, hépatites.....

Conduite à tenir en cas de suspicion

Identification et objectifs du signalement de la dengue, du chikungunya et du Zika

Prévention individuelle

- = PPAV¹

Diurne ou nocturne, selon le vecteur

- Ventilation
- Diffuseurs électriques
- Tortillons fumigènes
- Répulsifs peau 3 fois/j
- Port de vêtements longs et clairs
- Moustiquaires

¹ Protection personnelle antivectorielle

NB. N'ont pas fait la preuve de leur efficacité : bracelets, ultrasons, Vit A et B, homéopathie, raquettes électriques, rubans, papiers et autocollants sans insecticides...

Principaux messages de prévention à l'attention des personnes atteintes de la dengue, du chikungunya ou du Zika

Portez des vêtements amples et couvrants

Appliquez des répulsifs cutanés

Utilisez des ventilateurs

Limitez vos déplacements

dengue / chikungunya

Éviter les piqûres de moustique c'est protéger notre santé et celle de notre entourage.

PROTÉGEONS NOUS !

Le moustique peut transmettre les virus de la dengue et du chikungunya.

- ventilation
- diffuseurs électriques
- serpentins
- sprays et crèmes
- vêtements longs
- moustiquaires

PPAV : moyens

Horaire selon la pathologie à prévenir!

Tableau 6 : Moyens de PPAV disponibles contre les piqûres de moustiques

Moyens recommandés :

- Moustiquaire imprégnée d'insecticide pour lit, berceau ou poussette, selon l'âge ;
- Moustiquaire non imprégnée (si l'imprégnation n'est pas possible) ou en l'absence de risque de paludisme ;
- Moustiquaires grillagées aux fenêtres et aux portes ;
- Répulsifs cutanés sur les parties du corps non couvertes, en complément du port de vêtements amples, couvrants et légers.

Moyens d'appoint :

- Diffuseur électrique d'insecticide (à l'intérieur) ;
- Raquettes électriques ;
- Pulvérisation intra-domiciliaire de « bombes » insecticides (disponibles dans le commerce) ;
- Climatisation ;
- Ventilation ;
- Serpentin fumigène (extérieur).

Moyens non recommandés (efficacité non démontrée contre les maladies - à ne pas utiliser) :

- Bracelets anti-insectes ;
- Huiles essentielles ;
- Appareils sonores à ultrasons, vitamine B1, homéopathie, rubans, papiers et autocollants gluants sans insecticide.

PPAV :

Contre quels arthropodes et agents?

Quand?

Où?

Comment?

tuatou

Tableau 5 : Arthropodes, agents pathogènes transmis, maladies, répartition géographique moyens de prévention (liste non exhaustive)

Arthropodes	Maladies/ agents transmis	Période d'activité	Zones à risque	Prévention
INSECTES				
Cératopogonidés (mouchérons)	Fortes nuisances Filiaires et virus non pathogènes	Le jour Plus particulièrement à l'aube et au crépuscule	Cosmopolite	Vêtements couvrants Utilisation de répulsifs cutanés
<u>Mouches piqueuses</u> : Glossines	Trypanosomiase africaine (Maladie du sommeil)	Le jour	Afrique tropicale	Utilisation de répulsifs cutanés Vêtements couvrants
Taons (Chrysops)	Loase (Loa-Loa)	Le jour	Afrique de l'Ouest	
<u>Moustiques</u> : Anopheles	Paludisme Filarioses lymphatiques	De la tombée de la nuit au lever du jour	Zones tropicales	
Aedes	Arboviroses (Dengue, fièvre jaune, Zika, Chikungunya, ...) Filiaires	Journée	Zones tempérées et tropicales	Utilisation de répulsifs cutanés Vêtements couvrants Vaccination contre encéphalite japonaise (cf. chapitre vaccination)
Culex	Virus West Nile Encéphalite japonaise Filariose lymphatique	Tombée de la nuit et la nuit	Zones tempérées Asie	
Phlébotomes	Leishmanioses cutanées Leishmanioses viscérales Leishmanioses cutanéomuqueuses Arboviroses Bartonellose (B. bacilliformis)	Du coucher au lever du soleil Parfois le jour en forêt tropicale	Amérique centrale et du Sud Afrique Moyen-Orient Sous-continent indien Asie centrale et du Sud Pourtour méditerranéen Amérique du Sud	Utilisation de répulsifs cutanés Utilisation de moustiquaires imprégnées Vêtements couvrants Éviter de marcher la nuit avec une lumière notamment frontale

HCSP Mai 2023.

Recommandations sanitaires aux voyageurs

PPAV :

Contre quels arthropodes et agents?

Quand?

Où?

Comment?

Arthropodes	Maladies/agents transmis	Période d'activité	Zones à risque	Prévention
Punaises (réduves, dont les triatomés)	Trypanosomose américaine (Maladie de Chagas)	La nuit À l'intérieur des habitations précaires/rurales	Amérique latine (principalement en zone amazonienne, le risque étant plus élevé en zone rurale et en habitats traditionnels)	Utilisation de moustiquaires imprégnées
Punaises de lit (Cimex)	Aucune mais salive allergisante	La nuit	Cosmopolite	Aucune vraiment efficace
Puces	Peste Rickettsioses (Fièvre boutonneuse à	Jour et nuit	Madagascar Asie Amérique Afrique	Hygiène corporelle

Poux de corps	puce, typhus murin) Bartonellose Rickettsioses (Typhus exanthématique) Bartonellose (Fièvre des tranchées) Borréliose (Fièvre récurrente)	Jour et nuit	Dans tous les pays, en zone défavorisée	Lavage des vêtements à plus de 50 °C Hygiène corporelle
Simulies	Onchooceroose	Le jour	Amérique latine Afrique tropicale	Utilisation de répulsifs cutanés Vêtements couvrants
TIQUES				
Tiques dures	Rickettsioses (différentes tiques) Borréliose de Lyme (Ixodes), Fièvre Crimée Congo (Hyalomma) Babésioses (Ixodes) Virus de l'encéphalite à tique (Ixodes) Ehrlichiose, Anaplasmoses Autres arboviroses	Le jour	Cosmopolite : différentes espèces Zones tempérées de l'hémisphère nord Afrique, Moyen-Orient, Europe du sud Hémisphère nord	Vêtements couvrants Répulsifs cutanés Vaccination contre encéphalite à tiques (cf. chapitre vaccination 1.5)
Tiques molles	Borrélioses (Fièvres récurrentes à tique)	La nuit	Amérique du Nord Afrique Moyen Orient	Aucune vraiment efficace

HCSP Mai 2023.

Recommandations sanitaires aux voyageurs

PPAV : quelles molécules?

Selon âge/terrain et pour tropiques

Répulsifs peau

NB : crème solaire à appliquer 20 minutes avant les répulsifs

Répulsifs tissus : pyréthrinoides

Ne plus utiliser pour les vêtements, sauf exception (rapport bénéfice/risque revu en 2022)

A utiliser pour imprégner moustiquaires et tentes

Spray : 2 à 3 lavages

Trempage : 4 à 5 lavages

Imprégnation industrielle : plusieurs mois

Tableau 7 : Répulsifs disponibles pour la protection contre les piqûres d'arthropodes. D'après Debboun M., Frances SP., Strickman DA. Insect repellents handbook, CRC Press 2015 [36,44].

Molécules ou substances actives	Concentrations usuelles [concentration efficace min]	Arthropodes ciblés (par ordre alphabétique)	Avantages	Inconvénients	Enfants * (concentrations)	Femmes enceintes (concentrations)
Produits disposant d'une AMM (présence du numéro d'AMM sur l'étiquette) et un RCP						
DEET (N,N-diéthyl-m-toluamide)	30 à 50 % [10 à 25 %]	Aoûtats, Culicoides, Moustiques, Phlébotomes, Simulies, Tiques dures.	Recul quant à son utilisation.	Huileux, Altère les plastiques, Irritant pour les yeux.	10 % entre 1 et 2 ans 30 % et plus à partir de 2 ans	≤ 30 % Uniquement en zone à risque élevé
IR3535 (N-acétyl-N-butyl-β-alaninate d'éthyle)	20 à 35 % [10-20 %]	Aoûtats, Culicoides, Moustiques, Phlébotomes, Stomoxes, Tiques dures.	Faible odeur. Non huileux. N'altère pas les plastiques. Efficace contre les tiques.	Durée d'efficacité sur <i>Anopheles</i> parfois moindre que le DEET aux concentrations ≤ 20 %	10 à 20 % entre 6 mois et 2 ans 35 % à partir de 2 ans	≤ 20 %
Produits en cours d'évaluation au niveau européen						
Icaridine ou picaridine ou KBR3023 (Carboxylate de Sec-butyl 2-(2-hydroxyéthyl)pipéridine-1)	20 à 25 % [10-20 %]	Aoûtats, Culicoides, Mouches piqueuses (glossines et taons, ...), Moustiques, Puces, Tiques dures.	Large spectre d'activité. N'altère pas les plastiques. Faible odeur.	Pas aussi efficace que le DEET contre les tiques, certaines anophèles et les culicoides	10 % à 25 % partir de 24 mois	≤ 20 %
Huile d' <i>Eucalyptus citriodora</i> , hydratée, cyclisée (produit naturel, le PMD ou para-menthane-3,8 diol étant un produit de synthèse)**	10 à 30 %	Culicoides, Mouches piqueuses, Moustiques, Tiques dures.	Large spectre d'activité.	Evaluation partielle, Moindre durée d'efficacité Forte odeur, Très irritant pour les yeux	Pas chez les enfants de moins de 3 ans***	≤ 10 %

* : Pour les nourrissons, l'utilisation d'une moustiquaire sur le berceau ou le landau est recommandée

** : L'huile d'eucalyptus n'est pas une huile essentielle à base d'Eucalyptus mais un extrait de plante contenant le produit actif.

*** : CDC Atlanta, Yellow book [43]

Prévention : vaccination

- **Commercialisés en France**

- Fièvre jaune (Stamaril®)
- Encéphalite japonaise (Ixiaro®)
- Encéphalite à tique (Ticovac® ou Encepur®)
- Dengue (Dengvaxia ®) : Vaccin vivant atténué, [Zone d'endémie](#), 6-45 ans, ATCD dengue confirmé, efficacité vaccinale (EV) 65%

- **Aux USA, en Europe ou AMM européenne en cours**

- Dengue (Qdenga®) :
 - Vaccin vivant atténué, M0-M3, dès 4 ans, pas de sérologie pré-vaccination
 - EV > 80% (M12 et M54 F sévères), 61% (M54)
- Chikungunya (Ixchik®) : Vaccin vivant atténué, 1 dose, EV > 99% (M24)

- **En développement**

- Dengue
- West Nile
- Zika
- ...

Conclusion

- Problème de santé publique en zone d'endémie
- Arboviroses locales estivales (west nile, toscana V, Crimée-Congo, E. tique) et cas autochtones
- Y penser au **retour de voyage**... mais aussi de **mai à novembre**!

- Prévention
 - Protection personnelle antivectorielle : voyage, voire 7 j après retour de mai à novembre
 - Vaccination : zones d'endémie, voyageurs à venir...

Où trouver de l'aide?

Centres de vaccinations internationales

- Montpellier :
 - ✓ Institut Bouisson Bertrand : www.bouisson-bertrand.fr, secretariat@bouisson-bertrand.fr
 - ✓ CHU Montpellier, MIT : 04 67 33 77 14
- Liste CVI : https://www.mesvaccins.net/web/vaccinations_centers

HCSP : recommandations voyageurs

Arboviroses

Repères pour votre pratique. SPF Mai 2024

Arboviroses JNI 2019

<http://medecinetropicale.free.fr/cours/arboviroses.pdf>

E Pilly 2018

E-Pilly Trop

Sites d'informations voyageurs

Infovac.fr

diplomatie.gouv.fr

pasteur-lille.fr

mesvaccins.net

infectiologie.com

wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home