BILAN RÉGIONAL 2023

Docteur Evelyne BIAIS

Docteur Françoise REYNAUD-FAIDHERBE

Coordonnatrices Régionales d'Hémovigilance et de Sécurité
Transfusionnelle Occitanie

ACTIVITÉ TRANSFUSIONNELLE 2023

- La région Occitanie = **3^{ème}** région pour la transfusion sanguine en France (après l'IDF et l'AURA)
- C'est aussi la **4^{ème}** région en terme de population
- **131** ES transfuseurs
- **65** dépôts de sang
- **16** sites de délivrance
- **3 départements** sans site de délivrance EFS (Ariège, Gers et Lozère)

ACTIVITÉ TRANSFUSIONNELLE 2023

- **262 667** PSL homologues transfusés pour **50 964** patients (e-fit)
(↘ **2,5%** par rapport à 2022)

ACTIVITÉ TRANSFUSIONNELLE 2023

• - **205 731** CGR (↘)

- **35 278** plaquettes (↗)
- **21 553** PFC (↘)

86 PLYO (↗)

ACTIVITÉ TRANSFUSIONNELLE 2023

Traçabilité

- Moyenne régionale = **99,48%** (99,1% au niveau national en 2022)
 - Écarts: 94 à 100%
 - Traçabilité à 100% = **62%** des établissements (2/3)
→ seulement 13 ES (environ 10%) ont une traçabilité < **99%**
- importance en cas d'EIR++++ enquête ascendante
en cas d'IPD enquête descendante

ACTIVITÉ TRANSFUSIONNELLE 2023

Traçabilité

Informatisation

- **40** ES informatisés « en routine » / **131** ES

→ **30%**

- Prescription connectée pour 2 ES

→ CHU de Nîmes

→ CH de Béziers

ACTIVITÉ TRANSFUSIONNELLE 2023

Destructions

- Moyenne régionale: 0,81%
 - en augmentation par rapport à 2022 (+ 0,11%)
 - 2289 PSL détruits (2032 en 2022)
 - objectif de performance national atteint (< 1%)

% destructions sur 5 ans

Causes de destructions au niveau des ES

Décès (289 PSL soit 16,5%)

Surestimation des besoins (181 PSL soit 10%)

Prescription anticipée (197 PSL soit 11%)

Changement de décision thérapeutique (10%)

Modification état clinique (8%)

Autres causes de destructions au niveau des ES

→ **Transfert** du patient (SAMU)

→ **EIR**

→ **Résultats de laboratoire** (taux d'Hb ne nécessitant pas de transfusion, RAI positive)

→ **Refus** de transfusion (**41** destructions)

Information pré-transfusionnelle ++++

Causes de destructions EFS + dépôts de sang

- Causes non listées
- Péremption
- **Non respect des procédures**
- PFC percé
- Transport, rupture de la chaîne du froid

Déclarations d'EIR

- **1010** EIR (1003 en 2022)
→ aucun décès
- Grade 1 surtout (929) et 2 (66)
- 17 grade 3 (1,7%)
- 132 imputabilité exclue ($\approx$ 2022)

Déclarations d'EIR Etiologies

509 allo-immunisations (516 en 2022)

156 RFNH (162 en 2022)

80 allergies (↘) 93 en 2022

39 OAP de surcharge (37 en 2022)

38 réactions hypertensives (33 en 2022)

Déclarations d'EIR grade 3 étiologies

- Allergies (9/17 déclarations)
 - concentrés plaquettaires (3) mais aussi CGR (2) et PFC (1)
 - contexte de choc hémorragique (3)

- Infection bactérienne (4/17 déclarations)
(pathologie intercurrente, imputabilité du PSL exclue/NE)

- TACO (2)
- TRALI (1)
- Incompatibilité immunologique (1)
transfusion de CP, état de choc ,Ac anti-HLA +

Déclarations IG

- **110 IG** (90 en 2022)
 - **79** au niveau d'un ES (2/3)
 - **26** au niveau d'un site EFS (1/3)
 - **5** au niveau d'un tiers
- **22 IG** avec transfusion soit **20%**
- **une seule défaillance** dans **77%** des cas

Déclarations IG

- **110 IG** (90 en 2022)

FIG déclarées de 2019 à 2023

Déclarations IG

Principales défaillances

Déclarations IG

Principales défaillances

❑ Identification du patient (ES)

- étiquette ≠ résultats IH patient/prescription des PSL
- saisie nom usuel au lieu du nom de naissance
- étiquettes inadaptées (caractères tronqués)

❑ Prélèvement IH clinique (ES)

- erreur d'étiquetage des tubes (bon patient, mauvaise étiquette)
- erreur de prélèvement (mauvais patient)

Souvent découvert à l'EFS (résultat discordant/antériorité connue)

Déclarations IG

Principales défaillances

Erreur de délivrance de PSL (EFS)

- oubli de délivrance sur urgence relative
- erreur identification receveur
- délivrance inadaptée /prescription (non respect du phénotype)
- erreur de date/heure
- T° non conforme pendant la conservation
- erreur de type de PSL
- erreur d'établissement

Déclarations post-don

- En diminution d'environ **15%** par rapport à 2022 (-39)
- **Principales étiologies**
 - **transfusion** et prise de **médicaments** comme en 2022 (**entretien pré-don**)
 - 3^{ème} cause = **syndrome digestif** (**appel post-don**)
- **Autres:** infection pneumo (12)
 - infection urinaire (7)
 - séroconversion:** syphilis (10)
 - VHB (7)
 - coronavirus (7)