I. La consommation d'antibiotiques en France

I.1. La consommation a diminué de 11,4 % entre 2000 et 2015, mais une tendance à la reprise se confirme depuis 2010

Figure n° 1 : évolution de la consommation d'antibiotiques en France

Outils pour le bon usage aux antibiotiques

Surveillance consommation ATB:

ECDC Summary of the latest data on antibiotic consumption in the EU, 2013

Figure 1. Consumption of antibiotics for systemic use in the community by antibiotic group in 30 EU/EEA countries, 2013 (expressed in DDD per 1 000 inhabitants and per day)

Outil de formation: ecdc

Aurélia Eden infectiologue
Perpignan
14,09,2017

- Plan de séance:
- 15 minutes Marie Odile Heiming : topo retour experience CHG
- 15 minutes: retour experience: medecin co ehpad: Ida Giorgi questionnaire
- 15 minutes: aurélia eden quels outils disponibles? Revue de de littérature
- 45 minutes :mise en pratique avec cas clinique avec boitier interactif

Il n'y a pas que l' evidence-based médecine!

Facteurs intervenants dans la prescription antibiotique

Perception des patients

Image des antibiotiques

En théorie

Schéma d'ensemble de la feuille de route 5 axes – 13 mesures – 40 actions

15

Sensibilisation des publics et
des professionnels

Formation et bon usage

Recherche et innovation

Surveillance et indicateurs

Gouvernance intersectorielle
et action internationale

Campagne nationale intersectorielle
Portail unique d'information, charte engagement

Aide à la juste prescription
Incitation et encadrement renforcés
Encourager le bon usage des antibiotiques
Promouvoir les mesures de prévention

Structurer et coordonner les efforts
Renforcer le partenariat public-privé
Valoriser les produits de lutte contre l'ABR

Améliorer la lisibilité de la surveillance
Elaborer de nouveaux indicateurs

Renforcer la coordination intersectorielle
Coordonner les actions à l'international

II - Formation et bon usage (1)

M3 – Aide à la juste prescription des professionnels de santé humaine et animale

4. [SA+SH] Formation initiale et continue des professionnels

- Modules de formation initiale pharmaciens, dentistes, sage-femmes, infirmiers, vétérinaires, ...
- Modules en ligne de formation continue
- Orientation nationale du DPC

5. [SA+SH] Centres régionaux d'appui et de conseil

- Réseaux d'appui et conseil (ARS)
- Appui des CPIAS
- [SA] Extension des référents régionaux en antibiothérapie vétérinaire

6. [SA+SH] Promotion et MAD d'outils

- Aides-mémos, datasets, LAP
- Fiche de non-prescription
- [SA] RPC vétérinaires – éleveurs

7. [SA+SH] Tests de diagnostic rapide

- TROD angine, urine
- [SA] Kits de diagnostic et tests de sensibilité

II - Formation et bon usage (2)

M4. Renforcer l'encadrement de la prescription et

M5. Encourager le bon usage des antibiotiques

8-9. Durée des traitements

- Limiter la durée de prescription à 7j pour les infections courantes
- Ordonnance dédiée, liée au TROD (LAP)

10-11. [SA+SH] Limiter atb « critiques »

- Antibiogramme restreint (IU)
- Suivi prescriptions (ROSP)
- [SA] observance décret avril 2016

12. [SA+SH] Conditionnements

- Adapter les conditionnements aux durées de traitement minimales
- Délivrance à l'unité
- {SA} Conditionnements adaptés et délivrance par fraction

13. [SA+SH] Mise en garde

- Message sur les boites (public) [SH+SA]

Posters destinés aux patients (salle d'attente)

Vaccination : êtes-vous à jour ? **2017**
calendrier simplifié des vaccinations

Âge approprié	1 mois	2 mois	4 mois	5 mois	11 mois	12 mois	14-18 mois	6 ans	11-13 ans	14 ans	25 ans	45 ans	65 ans et +
BCG													
Diphthérie-Tétanos-Poliomyélite													Tous les 10 ans
Coqueluche													
Haemophilus influenzae de type b (HIB)													
Hépatite B								Rattrapage possible jusqu'à 15 ans					
Pneumocoque													
Méningocoque C								Rattrapage possible jusqu'à 24 ans					
Rougeole-Oreillons-Rubéole													
Papillomavirus humain (HPV)													
Grippe													Tous les ans
Zona													

Comment la résistance aux antibiotiques se propage-t-elle?

La résistance aux antibiotiques est la capacité d'une bactérie à lutter contre l'action d'un ou de plusieurs antibiotiques. Les humains et les animaux ne deviennent pas résistants aux traitements antibiotiques; ce sont les bactéries qu'ils portent qui peuvent le devenir.

1 Les animaux peuvent être traités par antibiotiques et, donc, être porteurs de bactéries résistantes aux antibiotiques. Les légumes peuvent être contaminés par des bactéries résistantes aux antibiotiques issues de fumier animal utilisé comme engrais. 2 Les bactéries résistantes aux antibiotiques peuvent être transmises à l'homme par l'ingestion d'aliments et par contact direct avec les animaux.

Dans les élevages

3 Les humains reçoivent parfois des antibiotiques pour traiter les infections. Or, les bactéries peuvent développer une résistance à ces antibiotiques dans le cadre d'une réaction d'adaptation naturelle. Ces bactéries résistantes aux antibiotiques peuvent alors se propager d'un patient traité à d'autres personnes.

Dans la communauté

4 Les humains peuvent recevoir des antibiotiques à l'hôpital, puis porter des bactéries résistantes aux antibiotiques. Mais sales ou objets contaminés peuvent ensuite transmettre ces bactéries à d'autres patients. 5 Une fois rentrés chez eux, les patients éventuellement porteurs de bactéries résistantes aux antibiotiques peuvent transmettre ces bactéries résistantes à d'autres personnes.

Dans les établissements de soins

6 Les voyageurs qui ont reçu des soins hospitaliers au cours d'un séjour dans un pays où le niveau de résistance aux antibiotiques est élevé peuvent revenir avec des bactéries résistantes aux antibiotiques. 7 Même s'ils n'ont pas reçu de soins médicaux, les voyageurs peuvent véhiculer et importer des bactéries résistantes acquises à partir de l'environnement ou de l'environnement durant leur voyage.

Retour de voyage

Vidéos Information patients

- Film d'animation pour patient : <https://youtu.be/O2BAsPXGFs0>
- Film témoignages patients GRIVE : <https://www.grive-occitanie.fr/témoignages-patients/>
- Film info patient: <http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/bretagne-matin/et-si-reflechissait-avant-de-prendre-des-antibiotiques.html>
- Plaquettes info patient : <http://www.cclin-arlin.fr/Ville/bon-usage-antibiotiques.html>

Situations ne relevant pas d'une antibiothérapie

www.ansm.fr

Pathologies (les plus fréquentes en pratique courante)	Situations où les antibiotiques NE SONT PAS RECOMMANDÉS AUJOURD'HUI
---	--

INFECTIONS RESPIRATOIRES

Rhinopharyngites aiguës	Chez l'adulte et chez l'enfant, car ils n'accélèrent pas la guérison et ne préviennent pas la survenue de complications
Angines aiguës érythémateuses ou érythémato-pultacées	Si le test de diagnostic rapide (TDR) du streptocoque bêta-hémolytique du groupe A est négatif
Otites moyennes aiguës	
Otite purulente (<i>otalgie, hypoacousie, fièvre, inflammation tympanique, épanchement rétro-tympanique extériorisé ou non</i>)	Chez l'enfant, après l'âge de 2 ans, sauf en cas de symptomatologie bruyante (fièvre élevée,otalgie intense)
Otite congestive (<i>congestion, reliefs normaux sans bombement, début rhinoré</i>)	Chez l'enfant quel que soit son âge
Otite séromucosale (<i>absence de persistance des</i>)	
Otite séromucosale (<i>sans infla</i>)	
Sinu	Des rhinologiques, dominés par une rhinite aiguë ou puriforme, dans un contexte épidémique ; des formes sévères, des symptômes > 10 jours), sans tendance à l'amélioration

Pour les médecins dans leur bureaux!!

Bronchiolites	Chez l'enfant sans facteur de risques, antibiothérapie inutile en première intention
Bronchites aiguës	<ul style="list-style-type: none"> - Chez un enfant sans facteur de risques ; - Chez un adulte sain, sans pathologie respiratoire chronique ou sans co-morbidité
Exacerbations de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) <i>Chez l'adulte, le diagnostic de BPCO repose sur des épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) effectuées en dehors de tout épisode d'exacerbations chez des sujets à risque de BPCO (tabac) et/ou devant une symptomatologie chronique (toux, exacerbation, dyspnée) et devant des épisodes répétés</i>	Devant une exacerbation chez un patient « BPCO », dont l'état en dehors de toute exacerbation est : <ul style="list-style-type: none"> - une absence de dyspnée ou un VEMS > 50 % aux EFR, - une dyspnée d'effort ou un VEMS < 50 % aux EFR, si l'expectoration n'est pas franchement chronique

Ou les infirmiers!!

INFECTIONS URINAIRES

Colonisation urinaire ou bactériurie asymptomatique
= situations de portage (présence de bactéries détectées à l'examen cytobactériologique des urines sans que celles-ci ne génèrent de manifestations cliniques)

Chez l'adulte, en dehors de la grossesse

Répartition des prescriptions d'antibiotiques en ville, par diagnostic (année 2011)

La fièvre n'est pas un déficit en Rocéphine!

Réticences des personnels hospitaliers à se faire vacciner contre la grippe A

GRIPPE :
POUR ÉVITER L'HOSPITALISATION,
PASSEZ À LA VACCINATION

Diarrhée sous ATB, arrêt? CD?

Colonisation urinaire

1er motif de prescription : les maladies virales

2ème motif de prescription: les angines

2011

Durée <7j

Ordonnance de non prescription:

https://www.ameli.fr/.../information-antibiotiques-non-prescrits_assurance-maladie.pd

Aujourd'hui, je vous ai diagnostiqué une infection qui ne nécessite pas d'antibiotiques.

DATE : / /

NOM DU PATIENT :

CACHET MÉDECIN

Pourquoi n'avez-vous pas besoin d'un antibiotique aujourd'hui ?

Le rhume (rhinopharyngite), la grippe, la bronchite aiguë et la plupart des otites et des angines sont de nature virale et guérissent donc sans antibiotiques.

Avec ou sans antibiotiques, vous ne guérez pas plus vite. Le tableau ci-dessous vous indique la durée habituelle des symptômes de ces maladies (avec ou sans antibiotiques).

☒	MALADIE	DURÉE HABITUELLE DES PRINCIPAUX SYMPTÔMES
☐	RHINOPHARYNGITE (RHUME) • <i>Toujours virale.</i>	• Fièvre : 2-3 jours. • Nez qui coule (sécrétions de couleur blanche, jaune ou verte), nez bouché : 7-12 jours. • Toux : 1 à 3 semaines.
☐	GRIPPE • <i>Infection virale.</i>	• Fièvre, courbatures : 2-4 jours. • Toux : 2-3 semaines. • Fatigue : plusieurs semaines.
☐	ANGINE VIRALE • <i>Test diagnostique rapide de recherche de streptocoque négatif.</i>	• Fièvre : 2-3 jours. • Mal à la gorge : 7 jours.
☐	BRONCHITE AIGÜE • <i>Quasiment toujours virale.</i> • <i>Les toux grasses avec des sécrétions jaunes ou verdâtres font partie de l'évolution naturelle de la maladie.</i>	• Fièvre : 2-3 jours. • Toux : 2-3 semaines.
☐	OTITE AIGÜE • <i>Après l'âge de 2 ans, guérit le plus souvent sans antibiotiques.</i>	• Fièvre, douleur : 3-4 jours.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR SOULAGER VOS SYMPTÔMES

- Buvez suffisamment : vous ne devez pas avoir soif.
- Adaptez votre activité physique, cela aide votre corps à guérir.
- Il existe des médicaments contre la fièvre ou la douleur. Suivez la prescription de votre médecin ou demandez conseil à votre pharmacien.

i Si vous avez de la fièvre (température > 38,5°C) durant plus de 3 jours, ou si d'autres symptômes apparaissent, ou que votre état de santé ne s'améliore pas, vous devez reconsulter votre médecin.

Pourquoi faut-il prendre un antibiotique seulement quand c'est nécessaire ?

- Les antibiotiques peuvent être responsables d'effets indésirables, comme les allergies ou la diarrhée.
- Les bactéries peuvent s'adapter et survivre en présence d'antibiotiques. Ainsi, plus vous prenez des antibiotiques, plus les bactéries présentes dans votre corps (peau, intestin) risquent de devenir résistantes.
- Les bactéries résistantes aux antibiotiques peuvent être la cause d'infections difficiles à guérir, et vous pouvez aussi les transmettre à vos proches.

En prenant un antibiotique uniquement lorsque c'est indispensable, vous contribuez à prévenir l'apparition de bactéries résistantes aux antibiotiques.

i Ce document est adapté à votre cas. Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.

Avec ou sans antibiotiques, vous ne guérez pas plus vite.

Extrait d'un document rédigé par le Groupe Recommandations de la SPILF et basé sur la littérature récente. Il propose des durées d'antibiothérapie raccourcies pour les situations simples, en particulier en choisissant la borne basse de la fourchette lorsque des intervalles sont proposés dans les recommandations initiales.

Document intégral, en PDF et en anglais, pour les abonnés à MMI : <http://dx.doi.org/10.1016/j.medmal.2017.01.007>

Durée des antibiotiques

www.infectiologie.com/UserFiles/File/spilf/.../info-antibio/info-antibio-2017-mars.pdf

Infections respiratoires hautes

- 5 jours: - Otite moyenne aiguë (OMA) de l'enfant à partir de l'âge de 2 ans, non récidivantes, sans otorrhée
- Sinusite maxillaire de l'adulte
- 6 jours: Angine à Streptocoque du groupe A traitée par amoxicilline
- 10 jours: - OMA de l'enfant < 2 ans, ou récidivante, ou avec otorrhée
- Sinusite maxillaire de l'enfant
- Sinusite frontale

Infections respiratoires basses

- 5 jours: - Exacerbations de BPCO
 - Pneumonies communautaires de l'enfant
 - 7 jours: Pneumonies communautaires de l'adulte.
- Une évolution clinique et/ou biologique favorable pourrait permettre de réduire la durée de traitement (3-5 jours), cependant les données de la littérature restent encore insuffisantes. Des études sont en cours.

Bactériémies liées aux cathéters veineux centraux (BLC)

- 5 jours: BLC à staphylocoque coagulase négative, après retrait du cathéter
- 7 jours: BLC à streptocoques, entérocoques et BGN, après retrait du cathéter
- 10 jours (+ verrou local antibiotique): BLC si cathéter laissé en place, SAUF *S. aureus*
- 14 jours: BLC à *S. aureus*, après retrait du cathéter
- 21 jours: thrombophlébite suppurée

Si localisation 2^{ndaire} ou endocardite infectieuse, la durée peut être modifiée

Bactériémies primaires non compliquées

- En l'absence d'endocardite infectieuse et de localisation secondaire
- 5 jours: staphylocoques à coagulase négative, streptocoques oraux
 - 7 jours: entérobactéries, entérocoques
 - 10 jours: bacilles à Gram négatif non fermentants
 - 14 jours: *S. aureus* et *S. lugdunensis*.

Endocardites infectieuses (hors chirurgie) et infections de stimulateurs implantables (pace-maker = PM) et défibrillateurs (DAI).

- 1 semaine: - bactériémie non compliquée sur PM ou DAI explantés, sauf *S. aureus*
 - 2 semaines:
 - bactériémie non compliquée sur PM ou DAI explantés à *S. aureus*
 - Et à streptocoque pénicillino-sensible, si association Bactammine + aminoside
 - 4 semaines:
 - Et sur valve native non compliquée
 - Et sur PM ou DAI explantés
 - 6 semaines:
 - Et sur valve prothétique
 - bactériémie sur PM ou DAI non explantables
- Et = endocardite infectieuse. Si localisation 2^{ndaire}, la durée peut être modifiée

Méningites bactériennes

- 5 jours: - méningite à *N. meningitidis*
- 7 jours: - méningite à *H. influenzae* ou à *S. pneumoniae*
- 14 jours: - méningite à *S. agalactiae*
- 21 jours: - méningite à *L. monocytogenes* ou à BGN (hors *H. influenzae*)

Infections de la peau et des tissus mous

- 3 jours: infections cutanées superficielles (quand un antibiotique est indiqué)
- 5 jours: traitement préemptif en cas de morsure par un animal
- 7 jours: dermo-hypodermite bactériennes, dont érysipèle, infections de plaie et abcès cutanés étendus (surface de la lésion > 75 cm²).

Infections intra-abdominales (IIA):

- ≤ 24 heures: - Perforation digestive opérée,
 - Appendicite opérée non perforée,
 - Cholécystite opérée dans les 24 heures, non compliquée
 - 3 jours: - Péritonite communautaire localisée opérée ou drainée*
 - Angiocholite drainée
 - Diarrhée aiguë nécessitant une antibiothérapie
 - 4 jours: Péritonite communautaire généralisée opérée ou drainée*
 - 5 jours: - Infection de liquide d'ascite, communautaire
 - Fièvre typhoïde (si azithromycine)
 - 8 jours: - Péritonites postopératoires si le traitement antibiotique probabiliste est actif sur les germes isolés en peropératoire
 - 10 jours: Infection à *Clostridium difficile* toxigène
- * contrôle de la source de l'infection

Infections urinaires

- 1 jour (dose unique): cystite aiguë simple (fosfomycine trométamol)
- 3 jours: cystite aiguë sur sonde urinaire
- 5 jours: - cystite aiguë simple (pivémécillan ou nitrofurantoïne)
- cystite aiguë à risque de complications ou associée aux soins (cotrimoxazole ou fluoroquinolone)
- 7 jours: - cystite aiguë à risque de complications ou associée aux soins (antibiotique autre que cotrimoxazole ou fluoroquinolone)
- pyélonéphrite aiguë (fluoroquinolone ou bêta-lactamine injectable)
- 10 jours: pyélonéphrite aiguë grave et/ou à risque de complication et/ou associée aux soins et/ou antibiotique autre que fluoroquinolone ou bêta-lactamine injectable.
- 14 jours: infection urinaire masculine (cotrimoxazole ou fluoroquinolone) communautaire ou associée aux soins

Infections génitales hautes et infections sexuellement transmises.

- Dose unique: urétrite et cervicite (ceftriaxone 500 mg IM + azithromycine 1 g per os)
- 10 jours: Infections génitales hautes non compliquées (alternative : ceftriaxone 500 mg IM dose unique + azithromycine per os 1g 2 prises à 7 jours d'intervalle)
- 14 jours: Infections génitales hautes compliquées (abcès tubo-ovariens, pelvi-péritonite)

Infections ostéo-articulaires

- 6 semaines:
 - infections sur matériel prothétique ostéo-articulaire (la prise en charge des cas complexes est à discuter avec le centre de référence des infections ostéo-articulaires complexes)
 - spondylodiscite (hors matériel d'ostéosynthèse)
 - ostéo-arthrite sur pied diabétique sans prise en charge chirurgicale

Neutropénie fébrile

- Durées à retenir:
 - 3 jours: si absence de documentation clinique et microbiologique
 - et absence de signes de gravité
 - et patient stable
 - et apyrexie depuis 48 heures
 - et surveillance de 48h en milieu hospitalier si persistance de la neutropénie (reprise immédiate de l'antibiothérapie si reprise de la fièvre)
 - 7 jours: si documentation microbiologique*
 - et apyrexie de plus de 4 jours
 - et éradication microbiologique
 - et résolution des signes cliniques d'infection
 - * Durée à adapter au pathogène isolé et au foyer éventuel

Charte d'engagement établissement

www.crs-saint-luc.fr/.../charte_etablissement%20antibio%20juste%20ce%20qu%20i

PRÉSERVER l'efficacité
des antibiotiques,
LIMITER l'émergence
des bactéries multirésistantes

CHARTE D'ENGAGEMENT DES ÉTABLISSEMENTS AU JUSTE USAGE DES ANTIBIOTIQUES

LOGO de
l'établissement

Les antibiotiques ont permis de sauver des millions de vies.

Mais leur usage trop fréquent et souvent inadapté a favorisé l'émergence de la résistance des bactéries, responsable d'une augmentation du nombre de morts par infections bactériennes malgré le recours à des traitements de plus en plus complexes.

Cette situation peut remettre en cause de nombreux progrès médicaux que l'on croyait acquis (prothèses articulaires, transplantations d'organes, chimiothérapies anti-cancéreuses, prise en charge des prématurés et des patients de réanimation...).

Il est urgent de s'engager individuellement et collectivement dans la **mise en œuvre d'actions simples et dont l'efficacité est clairement démontrée**.

C'est pourquoi, l'établissement a décidé de promouvoir, en s'appuyant sur l'organisation existante en la matière et en particulier de référent antibiotiques, une utilisation raisonnée des anti infectieux :

ACTION 1 L'établissement s'engage à suivre sa consommation d'antibiotiques, et à présenter régulièrement à l'ensemble des prescripteurs une analyse critique de son évolution rapportée à son écologie bactérienne.

ACTION 2 Un référent antibiotique est identifié au sein de l'établissement. Il est le coordonnateur de la politique de bon usage des antibiotiques dans l'établissement et est soutenu par l'institution. Les missions et moyens qui lui sont attribués sont clairement établis et adaptés à la taille de l'établissement.

ACTION 3 L'établissement s'engage à apporter à tout nouveau prescripteur une formation spécifique dans le domaine du juste usage des antibiotiques, et inscrit la prescription des antibiotiques dans les orientations prioritaires de formation pour l'ensemble des prescripteurs.

ACTION 4 Hors ses murs, l'établissement propose et soutient les actions visant à améliorer la prescription des antibiotiques en médecine libérale et dans les établissements de santé et médico-sociaux limitrophes.

Le,

Signatures :

Avec le soutien des sociétés savantes : Association Française d'Urologie, Société de Pneumologie de Langue Française, Société de Réanimation de Langue Française, Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français, Collège de la Médecine Générale, Collège National des Généralistes Enseignants, Société Française de Pédiatrie, Société Française de Neurologie, Société Française de Neurochirurgie, Société Française de Dermatologie, Société Française de Gériatrie et Gérontologie, Société Française d'Anesthésie Réanimation, Société Française de Microbiologie, Société Française d'Hygiène Hospitalière, Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique.

Information pour tous

- /transmission croisée: SHA
- Vaccins: qui est vacciné de la grippe dans la salle!!
- Charte d'engagement
- Quizz ludique

Quizz ludique = formation involontaire

Quizz Antibiotiques

18 Novembre 2016

Nous profitons de la journée de sensibilisation aux antibiotiques pour vous soumettre un quizz. Il est distribué par votre référent auprès des établissements de santé des Pyrénées Orientales et de l'Aude. Merci de votre participation. Les réponses adéquates seront distribuées par mail.

Etes-vous : Pharmacien Médecin

- 1 Les antibiotiques sont indiqués dans un érysipèle.
Vrai Faux
- 2 Les antibiotiques sont indiqués pour un ECBU positif à E coli multi résistant.
Vrai Faux
- 3 Les antibiotiques sont indiqués pour prélèvement d'escarre positif à staphylocoque aureus.
Vrai Faux
- 4 Une bithérapie est nécessaire dans les pneumopathies non hypoxémiantes.
Vrai Faux
- 5 On peut stopper l'antibiotique à J3 d'une guérison clinique d'infection broncho pulmonaire non documentée.
Vrai Faux
- 6 On contrôle l'ECBU après traitement efficace d'une prostatite, et on contrôle la coproculture après guérison d'une colite à clostridium difficile.
Vrai Faux
- 7 Le traitement d'une prostatite à entérocoque faecalis est l'amoxicilline.
Vrai Faux
- 8 Le vaccin anti grippal des soignants protège leurs familles, les soignés et diminue les antibiotiques.
Vrai Faux
- 9 Les aminosides sont indiqués en association dans les pyélonéphrites simples.
Vrai Faux

Implementing an Antibiotic Stewardship Program:
Guidelines by the Infectious Diseases Society of America
and the Society for Healthcare Epidemiology of America

What else?

Référent ATB= pharmacien/biologiste/cliniciens

(équipe: plus sympa!)

Guide antibiotique (à récupérer!!)

Diminution conso ATB: diminution CD

Population médicale particulière:

réanimateur/hémato/oncologue/gériatre...

Population patients particulière:

Neutropénie/ID/patient d'EHPAD/ fin de vie

Dans un monde idéal!!

Institutionnel:
charte

Patient: information,
vaccination

Antibiotique

Médecin: antibioticoclic
Tdr BU, ordonnance de
non prescription,
vaccination

Pharmacien: alarme
durée J3 J7,
bon usage pharmaco

Biologiste:
ATBG restreint,
interprétation/
colonisation urinaire

Situations ne relevant pas d'une antibiothérapie

www.ansam.fr

Pathologies (les plus fréquentes en pratique courante)	Situations où les antibiotiques NE SONT PAS RECOMMANDÉS AUCUNJOUR
INFECTIONS RESPIRATOIRES	
Rhino-pharyngites aiguës	Chez l'adulte et chez l'enfant, car ils n'accompagnent pas la guérison et ne préviennent pas la survenue de complications.
Angines aiguës érythémateuses ou érythémato-pellucées	Si le test de diagnostic rapide (TDR) du streptocoque bêta-hémolytique du groupe A est négatif.
Otitis moyennes aiguës	
Otite purulente (otite, pyocécuse, sévère, inflammation tympanique, épanchement tympanique extratympanal ou non)	Chez l'enfant, après l'âge de 2 ans, sauf en cas de symptômes sévères (fièvre élevée, otalgie intense).
Otite congestive (congestion, sécheresse normale sans gonflement, début rhinorrhagique)	Chez l'enfant quel que soit son âge.
Otite sérumotieuse (épanchement tympanique sans inflammation, ni otalgie, ni signes généraux)	Chez l'enfant, sauf en cas de persistance des symptômes au-delà de 3 mois.
Sinusites maxillaires aiguës	- Chez l'adulte, en cas de symptômes rhinologiques diffus, bilatéraux, d'intensité modérée, dominés par une congestion avec rhinorrhée séreuse ou puriforme basale, surveillés dans un contexte épidémique. - Chez l'enfant, en dehors des formes sévères, des formes subaiguës (symptômes > 10 jours), sans tendance à l'amélioration.

Situation pratique

- Vous travaillez comme médecin/pharmacien dans un centre de rééducation et vous avez le rôle d'antibioréfèrent depuis 2017.
- La pharmacie vous alerte sur une consommation en « nette augmentation » de ceftriaxone.
- Quid de votre surveillance ATB au sein de votre établissement?

Audit / pré requis

- Avez-vous une surveillance consommation ATB, type? consores? Globale par service
- Les résultats des consommation ATB sont rendus aux services cliniques? Oui/non
- Avez-vous déjà mené des EPP sur consommation ATB? Oui/non

Suite situation

- L'augmentation de la ceftriaxone est surtout retrouvé sur un service
- Que proposez-vous, comme action?

Réponses

1. Communication des résultats à équipe concernée, proposition d'EPP/ceftriaxone?
2. Formation et distribution guide antibiotique
3. Mise en place d'une alerte ceftriaxone J0-J3
4. Proposition d'utilisation restrictive de la ceftriaxone versus cefotaxime

Rappel bibliographique

- Quelles actions sont les plus efficaces?

Suite situation

- Aucune des actions proposées n'a pu aboutir et 6 mois plus tard , votre établissement déplore plusieurs cas d'infection à clostridium difficile
- Que faites- vous?

Proposition réponses

1. Retour sur infection clostridium et mésusage ATB auprès des soignants
2. Formation des soignants, diffusion d'un guide antibiotique
3. Élaboration, charte bon usage antibiotique pour votre établissement
4. Autres: